

子どもの定期予防接種一覧

【定期予防接種】

R6.4から

予防接種の種類		標準的な接種年齢	法律による対象年齢 (無料で接種できる年齢)	回数及び間隔	
不 活 化 ワ ク チ ン	5種混合 ・ジフテリア ・百日せき ・ポリオ ・破傷風 ・ヒブ	1期	初回: 生後2か月から1歳に達するまで	3回 (20日以上、標準的には56日までの間隔をおく)	
			追加: 1期初回3回終了後1年から1年6か月に達するまで	1回 (6か月以上の間隔をおけばできる)	
	4種混合 ・ジフテリア ・百日せき ・ポリオ ・破傷風	1期	初回: 生後2か月から1歳に達するまで	3回 (20日以上、標準的には56日までの間隔をおく)	
			追加: 1期初回3回終了後1年から1年6か月に達するまで	1回 (6か月以上の間隔をおけばできる)	
	2種混合 ・ジフテリア ・破傷風	2期	11歳から12歳に達するまで	11歳から13歳の前日	1回
	日本脳炎	1期	初回: 3歳から4歳に達するまで	生後6か月から7歳6か月の前日	2回 (6日以上、標準的には28日までの間隔をおく)
			追加: 4歳から5歳に達するまで		1回 (初回2回終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおく)
		2期	9歳から10歳に達するまで	9歳から13歳の前日	1回
	※特例対象者 ◎ 平成15年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方は20歳の前日まで定期予防接種として受けることができる ・未接種者の1期は標準の接種間隔で接種。2期は9歳以上で1期終了後、6日あければ接種できるのが望ましい ・1期を1回または2回した方は6日以上の間隔をおいて残りの2回または1回接種を行う。2期は2期は9歳以上で1期終了後、6日あければ接種できる				
	ヒブ	初回接種開始 生後2か月から7か月の前日	生後2か月から5歳の前日	生後2か月から7か月の前日に開始: 4回 初回: 27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回 追加: 3回目終了後7ヶ月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回 ※ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後12ヶ月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わない。追加接種は可能で初回接種最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回 生後7か月から1歳の前日に開始: 3回 初回: 27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて2回 追加: 2回目終了後7ヶ月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回 ※ただし、初回2回目の接種は、生後12ヶ月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わない。 追加接種は可能で初回接種最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回 生後1歳から5歳の前日に開始: 1回	
小児用肺炎球菌	初回 生後2か月から7か月の前日 追加 生後1歳から1歳3か月の前日	生後2か月から5歳の前日	生後2か月から7か月の前日に開始: 4回 初回: 標準的には生後12ヶ月までに27日以上の間隔をおいて3回 ※ただし2回目及び3回目の接種は生後24ヶ月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと (追加接種は実施可能) また初回2回目の接種が生後12ヶ月を越えた場合、初回3回目の接種は行わないこと (追加接種は実施可能) 追加: 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月以降において1回 生後7か月から1歳の前日に開始: 3回 初回: 標準的には生後13ヶ月までに27日以上の間隔をおいて2回 ※ただし2回目の接種は生後24ヶ月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと (追加接種は実施可能) 追加: 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月以降において1回 生後1歳から2歳の前日に開始: 2回 60日以上の間隔をおいて2回 生後2歳から5歳の前日に開始: 1回		
B型肝炎	生後2ヶ月から9ヶ月の前日	生後1歳の前日まで	3回 (27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種する。)		
子宮頸がん予防	中学1年生の女子	小学6年生から高校1年生相当の女子 キャッチアップ接種対象者: 平成9年度生まれから平成18年度生まれまでの女子	2価ワクチン(サーバリックス): 3回 1ヶ月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6ヶ月の間隔をおいて1回 ※ただし、上記方法をとることができない場合は1ヶ月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5ヶ月以上、かつ2回目の注射から2ヶ月半以上の間隔をおいて1回 4価ワクチン(ガーダシル): 3回 1回目接種から2か月の間隔をおいて2回目接種後、初回1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回 ※ただし、上記方法をとることができない場合は1ヶ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目から3ヶ月以上の間隔をおいて1回 9価ワクチン(シルガード) ・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合: 2回 5ヶ月以上の間隔をあける。5ヶ月未満の場合、3回目の接種が必要 ・1回目の接種を15歳になってから受ける場合: 3回 1回目の接種から2ヶ月の間隔をおいて2回目接種後、初回1回目の接種から6ヶ月の間隔をおいて1回 ※ただし、上記方法をとることができない場合は1ヶ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目から3ヶ月以上の間隔をおいて1回		
生 ワ ク チ ン	BCG	生後5か月から8か月に達するまで	生後1歳の前日	1回	
	麻しん 風しん混合	1期	生後1歳から2歳の前日 (このなかの早い時期)	1回	
		2期	小学校就学前の1年間にある4月から6月	5歳以上7歳の前日 (小学校就学前の1年間にある)	1回
	水痘	生後1歳から1歳3か月に達するまで	生後1歳から3歳の前日	2回 (3ヶ月以上、標準的には6ヶ月から12ヶ月までの間隔をおく)	
ロタウイルス	生後2か月から (初回接種は生後14週6日までに開始) ※初回接種を生後15週以降に受けることはお勧めしていません。	生後6週から24週まで 生後6週から32週まで	ロタリックス: 2回(27日以上の間隔をあけて2回) ロタテック: 3回(それぞれ27日以上の間隔をあけて3回)		

【任意予防接種】

予防接種の種類		接種年齢	回数及び間隔
ミ ワ ク チ ン	おたふくかぜ	1回目	生後12か月から15か月
		2回目	小学校就学前の1年間
ワ ク チ ン	季節性インフルエンザ	生後6か月以上13歳未満	10月下旬から12月中旬
		13歳以上	2回(2~4週間の間隔をあける。免疫を考慮すると4週間が望ましい)
		13歳以上	1回または2回